



МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____ 20__ р.

Київ

№ _____

Про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» та Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295, ураховуючи протокольне рішення від 21.09.2020 № 2 засідання Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів,

наказую :

1. Затвердити Перелік препаратів, розглянутих на засіданні Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів від 21.09.2020 згідно з протоколом № 2, та рекомендованих до реєстрації і внесення до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів (далі – Перелік), що додається.

2. Департаменту раціонального природокористування (Олександр БОНЬ):
здійснити державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів відповідно до затвердженого Переліку;

внести зазначені в Переліку пестициди і агрохімікати до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

3. Управлінню цифрової трансформації та моніторингу довкілля (Максим ЛОБОК) забезпечити розміщення доповнення до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів на офіційному вебсайті Міндовкілля.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра ХОРЄВА Михайла.

Міністр

Роман АБРАМОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України
2020 року №

ПЕРЕЛІК

препаратів, розглянутих на засіданні Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів від 21.09.2020 згідно з протоколом № 2, та рекомендованих до реєстрації і внесення до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів

Інсектициди, акарициди

№ пп	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Белт 480 SC, КС (флубендіамід, 480 г/л) Байер АГ, Німеччина	0,1 – 0,15	кукурудза	кукурудзяний стебловий метелик, лучний метелик, бавовникова совка	обприскування в період вегетації	30	2
2.	*Корморан, КЕ (новалурон, 100 г/л + ацетаміприд, 80 г/л) ТОВ «АДАМА Україна», Україна	0,4 – 0,8	картопля	колорадський жук, попелиці	обприскування в період вегетації	35	2
		0,4 – 0,8	томати	колорадський жук, попелиці, совки	обприскування в період вегетації	20	2
		0,4 – 0,8	цибуля	цибулева муха, трипси	обприскування в період вегетації	30	2
		0,4 – 0,8	яблуня	букарка, казарка, попелиці, яблуневий квітоїд, плодожерки, мінюючі молі, листовійки, довгоносик сірий бруньковий (брунькоїд), яблуневий плодовий трач (пильщик), совки	обприскування в період вегетації	30	2

3.	*Віарес, КС (ацетаміприд, 300 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,06 – 0,12	ріпак	ріпаківий квіткоїд, прихованохобітники, ріпаківий клоп, пильщик, попелиці, хрестоцвіті блішки, ріпаківий довгоносик	обприскування в період вегетації (перед, на початку, підчас або наприкінці цвітіння)	30	2
4.	Трансформ, ВГ (сульфоксафлор, 500 г/кг) Доу АгроСайенсіс ВмБХ, Австрія	0,024 – 0,048	пшениця, ячмінь	звичайна злакова попелиця, велика злакова попелиця	обприскування в період вегетації культури	28	1
		0,024 – 0,048	ріпак	попелиця капустяна	обприскування в період вегетації культури	27	1
		0,024 – 0,048	буряк цукровий	бурякова листкова попелиця	обприскування в період вегетації культури	13	1
		0,04 – 0,06	капуста	попелиця капустяна	обприскування в період вегетації культури	15	2
		0,05 – 0,1	яблуня	зелена яблунева, сіра яблунева, попелиця кров'яна	обприскування в період вегетації культури	14	2
5.	*Катадін, КЕ (ацетаміприд, 6,4% + емаектин бензоат, 4,8%) «ІФАГРІ ЛТД» IFAGRI LTD), Великобританія; «ПАРІДЖАТ ІНДАСТРІС ПВТ. ЛТД.» (PARIJAT INDUSTRIES PVT. LTD.), Індія	0,25 – 0,4	соя	капустяна совка, бавовникова совка, тютюновий трипс, акацієва (бобова) вогнівка	обприскування в період вегетації	14	2
		0,25 – 0,4	яблуня	листовійки, яблунева плодожерка, мінуючі молі, попелиці	обприскування в період вегетації	30	2
		0,25 – 0,4	капуста	капустяна міль, капустяна совка, капустяний білан	обприскування в період вегетації	14	2
6.	Райнер, ВП (ацетаміприд, 20%) ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD), Великобританія	0,05 – 0,075	буряк цукровий	щитососки	обприскування в період вегетації	30	2
		0,15 – 0,2	яблуня	попелиці, листовійки, яблунева плодожерка	обприскування в період вегетації	45	2
		0,1 – 0,12	пшениця	п'явиці, попелиці, жужелиці, хлібні жуки, хлібні клопи-черепашки	обприскування в період вегетації	30	2

7.	Децис 100 ЕС, КЕ (дельтаметрин, 100 г/л) Байер АГ, Німеччина	0,1 – 0,12	ячмінь	п'явиці, попелиці, жужелиці, хлібні жуки, хлібні клопи-черепашки	обприскування в період вегетації	30	2
		0,1 – 0,12	ріпак	ріпаківий квіткоїд, хрестоцвітні, блішки, клопи, попелиці, прихованохоботники	обприскування в період вегетації	30	2
		0,125 – 0,25	груша	плодожерки. Комплекс шкідників: довгоносики, попелиці, листовійки	обприскування в період вегетації	30	2
		0,1 – 0,15	виноград	гронова листовійка	обприскування в період вегетації	30	2
		0,125	персик	східна плодожерка	обприскування в період вегетації	30	2
		0,08	цибуля	цибулева муха	обприскування в період вегетації	20	2
		0,05 – 0,08	огірки	трипси, баштанна попелиця, росткова муха	обприскування в період вегетації	20	2
		0,08	морква	моркв'яна муха, моркв'яна листоблішка, моркв'яна попелиця	обприскування в період вегетації	20	2
		0,08	капуста	совки, капустяна міль, білани, блішки	обприскування в період вегетації	20	2
		0,125 – 0,25	яблуна	яблунева плодожерка, розанова листовійка, зелена яблунева попелиця, яблуневий квіткоїд	обприскування в період вегетації	30	2
		0,07 – 0,125	томати	попелиці, бавовникова совка	обприскування в період вегетації	20	2
		0,06 – 0,08	рис	звичайна злакова попелиця, ячмінний мінер, рисовий комарик	обприскування в період вегетації	20	2
7.	Децис 100 ЕС, КЕ (дельтаметрин, 100 г/л) Байер АГ, Німеччина	0,10 – 0,18	соя	сонцевик будяковий (чортополохівка), акацієва вогнівка	обприскування в період вегетації	30	2
		0,10 – 0,18	горох	звичайна злакова попелиця, гороховий зерноїд	обприскування в період вегетації	30	2

		0,10 – 0,18	кукурудза	кукурудзяний стебловий метелик, звичайна злакова попелиця	обприскування в період вегетації	30	2
		0,10 – 0,18	соняшник	сонцевик будяковий (чортополохівка), соняшникова шипоноско, тютюновий трипс, геліхризова попелиця	обприскування в період вегетації	30	2
8.	Еванс, КЕ (лямбда-цигалотрин, 5%) Заявник: ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD), Великобританія	0,15 – 0,2	пшениця	хлібний жук, трипси, блошки, цикадки, клоп-шкідлива черепашка, попелиця, п'явиці	обприскування в період вегетації	-	2
		0,15 – 0,2	ріпак	хрестоцвіті блішки, ріпаковий пильщик, ріпаковий квіткоїд	обприскування в період вегетації	-	2
		0,125 – 0,15	буряк цукровий	бурякові блішки, довгоносики, бурякова листкова попелиця, лучний метелик	обприскування в період вегетації	-	2
		0,1 – 0,125	горох	гороховий комарик, попелиці, трипси, довгоносики бульбочкові	обприскування в період вегетації	-	2

Фунгіциди

№ п/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Нордокс 75, ВГ (NORDOX 75 WG) (оксид міді, 860,0 г/кг) (еквівалент 750,0 г/кг Cu) NORDOX AS., Nordox A.S., Норвегія	1,0 – 1,5	яблуня	чорний рак, парша, бура плямистість або філостиктоз	обприскування рослин в період вегетації	30	4
		0,5 – 1,5	томати	фітофтороз, антракноз, альтернаріоз або бура плямистість (макроспоріоз), чорна бактеріальна плямистість	обприскування рослин в період вегетації	20	4
2.	Мелоді Duo 66,8 WP, ЗП (пропінеб, 613 г/кг + іпровалікарб, 55 г/кг) Байер АГ, Німеччина	2,5	виноградники	мільдю	обприскування в період вегетації	50	2
		2,0 – 2,5	картопля	фітофтороз, альтернаріоз	обприскування в період вегетації	40	2
3.	Авіатор Хпро 225 ЕС, КЕ (біксафен, 75 г/л + протіоконазол, 150 г/л) Байер АГ, Німеччина	0,6 – 0,8	ячмінь ярий та озимий	борошниста роса, іржасті хвороби, листові плямистості (сітчаста, темно бура, смугаста), ринхоспоріоз, рамуляріоз	обприскування в період вегетації	35	2
		0,8 – 1,25	пшениця яра та озима	листові плямистості піренофороз, септоріоз, борошниста роса, іржасті хвороби	обприскування в період вегетації	35	2
		1,25 – 1,5	пшениця яра та озима	фузаріоз, септоріоз	обприскування в період вегетації	35	2
4.	Солігор 425 ЕС, КЕ (протіоконазол, 53 г/л + спіроксамін, 224 г/л + тебуконазол, 148 г/л) Байер АГ, Німеччина	0,7 – 0,9	пшениця озима	борошниста роса, іржа, септоріоз листя, піренофороз	обприскування в період вегетації	30	2
		0,9 – 1,0	пшениця озима	септоріоз колоса, фузаріоз колоса	обприскування в період вегетації	30	2
		0,7 – 0,9	ячмінь ярий та озимий	листові плямистості: борошниста роса, іржа, гельмінтоспоріоз	обприскування в період вегетації (фаза 27 – 28)	30	2

		0,8 – 1,5	ячмінь ярий та озимий	листові плямистості: борошниста роса, іржа гельмінтоспоріоз	обприскування в період вегетації (фаза 31 – 32)	30	2
5.	Фокс 325 SC, КС (трифлуксістробін, 150 г/л + протіоконазол, 175 г/л) Байер АГ, Німеччина	0,6 – 0,8	кукурудза	антракноз, очна плямистість, іржа, гельмінтоспоріоз, церкоспороз, фузаріоз	обприскування в період вегетації	30	2
6.	*Амікон, ЕВ (міклобутаніл, 125 г/л + піраклостробін, 125 г/л) ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна	0,5 – 1,0	соняшник	антракноз, борошниста роса, іржа, септоріоз, сіра та біла гнилі, альтернаріоз, фомоз	обприскування посівів в період вегетації культури	30	2
7.	*Кросбі, СЕ (пропіконазол, 187,5 г/л+ тіофанат-метил, 375 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,4 – 0,6	пшениця озима	борошниста роса, септоріоз колосу, листя та інші плямистості, іржа (бура, стеблова та інші), фузаріоз, церкоспорельоз, кореневі гнилі	обприскування посівів в період вегетації культури	-	2
8.	Кларк, ВГ (азоксистробін, 500 г/кг) ІФАГРІ ЛТД (IFAGRI LTD), Великобританія	0,25 – 0,40	виноградники	мілдью, оїдіум, сіра гниль	обприскування рослин у період вегетації	30	2
		0,25 – 0,40	ріпак	фомоз, альтернаріоз, біла гниль, сіра, гниль, пероноспороз	обприскування рослин у період вегетації	30	2
		0,25 – 0,40	соя	борошниста роса, несправжня борошниста роса, фузаріоз, іржа	обприскування рослин у період вегетації	30	2
		0,25 – 0,40	пшениця	борошниста роса, септоріоз, фузаріоз, бура листові іржа, альтернаріоз	обприскування рослин у період вегетації	30	2
		0,25 – 0,40	ячмінь	борошниста роса, септоріоз, плямистості листя	обприскування рослин у період вегетації	30	2
		0,25 – 0,40	соняшник	борошниста роса, несправжня борошниста роса, фомопсис, іржа	обприскування рослин у період вегетації	30	2
		0,25 – 0,40	буряки цукрові	церкоспороз, борошниста роса, переноспороз	обприскування рослин у період вегетації	30	2

9.	*Пілартеп (Pilarterp), КС (тебуконазол, 230 г/л + піраклостробін, 115 г/л) Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd, Китай	0,45 – 0,6	пшениця озима	борошниста роса, септоріоз колосу, септоріоз листків, іржа, фузаріоз, церкоспорельоз, кореневі гнилі	обприскування рослин у період вегетації	35	2
		0,45 – 0,6	ячмінь ярий	борошниста роса, септоріоз колосу, септоріоз листків, іржа, плямистості листя, кореневі гнилі	обприскування рослин у період вегетації	35	2
10.	Тезис, КС (тебуконазол, 500 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,25 – 0,5	ріпак озимий	борошниста роса, альтернаріоз, циліндроспоріоз, фомоз, сіра гниль	обприскування посівів в період вегетації культури	30	2
		0,25 – 0,5	ріпак озимий	для припинення активного наростання наземної маси, накопичення пластичних речовин та прискорення росту кореневої системи восени	обприскування у фазі 3 – 5 листків культури	30	2
11.	ДОК Про, ЗП (цимоксаніл, 300 г/кг + міклобутаніл, 200 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,4 – 0,6	соняшник	пероноспороз, сіра та біла гнилі, альтернаріоз, фомоз	обприскування посівів в період вегетації культури	30	2

Препарати для протруювання насіння

Інсектициди

№ п/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5	6
1.	Модесто Плюс 510 FS, ТН (клотіанідин, 300 г/л + флуопіколід, 120 г/л + флуоксастробін, 90 г/л) Байер АГ Німеччина	14,0 – 16,0	соняшник	личинки коваликів - дротяники, личинки мідляків - несправжні дротяники, гусениці озимої совки, пероноспороз, фомоз, фомопсис	передпосівна обробка насіння
2.	*Альберто, ТН (тіаметоксам, 350 г/л) ТОВ «ПЕСТ. ЮЕЙ», Україна	0,4 – 0,5	пшениця озима	злакові мухи, цикадки, попелиці	передпосівна обробка насіння
		0,6 – 1,0	пшениця озима	хлібна жужелиця	передпосівна обробка насіння
3.	Пончо Вотіво 610 FS, ТН (клотіанідин, 508 г/л + <i>Bacillus firmus</i> 1-1582, 102 г/л) БАСФ Корпорейшн, США	60 – 120 мл/пос.од.	буряки цукрові	грунтові шкідники та шкідники сходів, нематоди	передпосівна обробка насіння

Фунгіциди

№ п/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5	6
1.	Орнамент FS, ТН (флудіоксоніл, 25 г/л) ТОВ «Клов», Україна; ТОВ «Грін Експрес», Україна	1,0	соя	пітіозна гниль, пліснявіння ннасіння, фузаріоз, пероноспороз, аскохітоз, антракноз, альтернаріоз	передпосівна обробка насіння

2.	Авідо, ТН (тіофанат-метил, 435 г/л + крезоксим-метил, 50 г/л + цимоксаніл, 15 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,5 – 1,0	соя	пліснявіння насіння, аскохітоз, антракноз, пероноспороз, кореневі гнилі	передпосівна обробка насіння
3.	Кінто Дуо, ТН (третіконазол, 20 г/л + прохлораз, 60 г/л) БАСФ Агро Б.В., Швейцарія	2,0 – 2,5	пшениця озима	тверда та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, септоріоз, борошниста роса.	передпосівна обробка насіння
		2,0 – 2,5	пшениця яра	тверда та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння.	передпосівна обробка насіння
		2,0 – 2,5	ячмінь озимий	тверда та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста плямистість.	передпосівна обробка насіння
		2,0 – 2,5	ячмінь ярий	тверда та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста плямистість.	передпосівна обробка насіння
		2,0 – 2,5	ячмінь озимий	тверда та летюча сажки, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста плямистість.	передпосівна обробка насіння
		2,0 – 2,5	жито	сажкові хвороби, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява	передпосівна обробка насіння
		2,0 – 2,5	третікале	сажкові хвороби, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява	передпосівна обробка насіння

Гербіциди

№ п/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	МайсТер Пауер 57,5 OD, МД (форамсульфурон, 31,5 г/л + йодосульфурон-метил- натрію, 1,0 г/л + тіенкарбазон-метил, 10 г/л + ципросульфамід, 15 г/л), Байер АГ, Німеччина	1,25 – 1,5	кукурудза	однорічні та багаторічні злакові, дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	обприскування посівів у фазі 3 – 7 листків культури	-	1
2.	Мерлін Флекс Дуо 475 SC, КС (ізоксальотол, 50 г/л + ципросульфамід, 50 г/л + тербутилазин, 375 г/л) Байер АГ, Німеччина	1,75 – 2,0	кукурудза	однорічні широколисті та злакові бур'яни	обприскування ґрунту до посіву, після посіву, але до появи 3-го листка культури	-	1
3.	Сойгарт WG, ВГ (хлоримурон-етил, 750 г/кг) ТОВ «Клов», Україна; ТОВ «Грін Експрес», Україна	0,012	соя	дводольні та деякі злакові бур'яни	обприскування в період вегетації	-	1
4.	Гроділ Максі 375 OD, МД (амідосульфурон, 100 г/л + йодосульфурон-метил натрію, 25 г/л + мефенпір-диетил, 250 г/л) Байер АГ, Німеччина	0,09 – 0,11	пшениця, ячмінь ярий (в т.ч. авіаметодом)	однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	обприскування від фази 2 – 3 листків у культури до появи прапорцевого листка включно	-	1
		0,1	кукурудза	однорічні та багаторічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	обприскування посівів у фазі 3 – 7 листків у культури	-	1
		0,1 – 0,11	льон	однорічні дводольні бур'яни	обприскування посівів у фазу "ялинка" культури (висота 5 – 10 см)	-	1

5.	МайсТер 62 WG, ВГ (форамсульфурон, 300 г/кг + йодоссульфурон-метил натрію, 20 г/кг + ізоксадифен-етил, 300 г/кг (антидот), Байер АГ, Німеччина	0,15 (препарату) +1,25 – 1,5 (ПАР БіоПауер SL 276,5 РК)	кукурудза	однорічні та багаторічні дводольні та злакові бур'яни	обприскування в період вегетації	-	1
6.	Баксіга, МД (флорпіраоксибензил, 12,5 г/л + пенноксулам, 20,0 г/л) Доу АгроСайенс ВмбХ, Австрія	2,0	рис	широколистяні, злакові та болотні бур'яни	обприскування в період вегетації	-	1
7.	Квелекс 200, ВГ (галауоксифен-метил, 100,0 г/кг + флорасулам, 100,0 г/кг + антидот флоквінтосет (у формі кислоти), 70,8 г/кг) Доу АгроСайенс ВмбХ, Австрія	0,05 – 0,06	пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий	дводольні бур'яни	обприскування в період вегетації	-	1
8.	Стомп 330, КЕ (пендиметалін, 330 г/л) БАСФ Агро Б.В., Швейцарія	2,5 – 4,5	петрушка коренева	однорічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування ґрунту протягом 2 – 3 днів після висівання (до сходів культури).	-	1
		2,5 – 4,5	цибуля – ріпка	однорічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування ґрунту до появи сходів культури	20	1
		3,0 – 6,0	кукурудза, соняшник	однорічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування ґрунту до появи сходів культури.	-	
		3,0 – 6,0	горох	однорічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування ґрунту до появи сходів культури.	25	1
		3,0 – 6,0	морква	однорічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування ґрунту до появи сходів культури.	-	
		3,0 – 6,0	часник, капуста (розсадна)	однорічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування ґрунту до появи сходів культури або до висадки розсади.	40	1
		3,0 – 6,0	томати (розсада)	однорічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування ґрунту до висадки розсади	35	1

		3,0 – 6,0	соя	однорічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
		5,0	картопля	однорічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування ґрунту після останнього підгортання до появи сходів культури	30	1
		2,0 – 4,0	пшениця озима та яра	однорічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування після сівби до кінця кушення культури (оптимально до появи сходів бур'янів при наявності вологи у посівному шарі ґрунту)	-	1
		2,0 – 4,0	ячмінь озимий та ярий	однорічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування після сівби до кінця кушення культури (оптимально до появи сходів бур'янів при наявності вологи у посівному шарі ґрунту)	-	1
9.	Базагран М, РК (бентазон, 250 г/л + 2М-4Х (МСРА), 125 г/л) БАСФ Агро Б.В., Швейцарія	2,0 – 3,0	пшениця, ячмінь, овес	однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур'яни	обприскування посівів у фазі кушіння	-	1
		2,0 – 3,0	зернові ярі та озимі (пшениця, овес, ячмінь) з підсівом конюшини	однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур'яни	обприскування посівів після розвитку 1-го трійчастого листка у конюшини (у фазі кушіння зернових)	-	1
		2,0 – 3,0	льон- довгунець	однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур'яни	обприскування посівів у фазу «ялинки» за висоти культури 3 – 10 см. Забороняється використання олії у харчовій промисловості	-	1
		2,0 – 3,0	рис	бульбоочерет та інші болотні бур'яни	обприскування посівів від фази 2-х листків до фази кушіння культури	-	1
		2,0 – 3,0	горох	однорічні дводольні	обприскування посівів у фазі 5 – 6 листків культури	-	1

10.	*Ксиор, КС (флуметсулам, 100 г/л + флорасулам, 75 г/л) ТОВ «Франдеса», Білорусь; ТОВ «Франдеса Україна», Україна; ТОВ «Річ Харвест», Україна	0,05 – 0,07	зернові колосові культури	однорічні і багаторічні дводольні бур'яни	обприскування в період вегетації	-	1
11.	*Сігур, ВГ (римсульфурон, 35 г/кг + нікосульфурон, 200 г/кг + мезотріон, 515 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,2 – 0,3 кг/га + ПАР Омега Екстра 0,5 л/га	кукурудза	однорічні, багаторічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування посівів у фазі 3 – 10 листків культури	-	1
12.	*Конкур, КС (метрибузин, 600 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,5-0,75	соє	однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
13.	АЙ-МОКС Екстра (I-MOX Xtra), ВГ (імазамокс, 700 г/кг) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Китай	0,045 – 0,06	соє	однорічні злакові та дводольні бур'яни	обприскування посівів в ранні фази розвитку бур'янів (1 – 3 справжніх листіків)	-	1
14.	ГАВАНЬ ПЛЮС (GAVAN PLUS), МД (мезотріон, 75 г/л + нікосульфурон, 30 г/л) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Китай	1,25 – 2,0	кукурудза	однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	обприскувати у фазі 3-7 листіків культури.	-	1
15.	РІДОВЕР ЕКСТРА (RID OVER XTRA), РГ (гліфосату амонійна сіль, 888 г/кг) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Китай	4,0 – 4,5	поля призначені під посів сільськогосподар- ських культур	однорічні та багаторічні бур'яни	обприскування вегетуючих однорічних і багаторічних злакових і дводольних бур'янів весною, за 14 днів до сівби с-г. культур та восени, після збирання попередника	-	1

Препарати для застосування авіаційним методом

Інсектициди, акарициди

<i>№ пп</i>	<i>Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна</i>	<i>Норма витрати препарату, (г,кг,л/га,м²,т)</i>	<i>Культура, об'єкт, що обробляється</i>	<i>Об'єкт, проти якого обробляється</i>	<i>Спосіб, час обробок, обмеження</i>	<i>Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)</i>	<i>Максимальна кратність обробок</i>
1.	Белт 480 SC, КС (флубендіамід, 480 г/л) Байер АГ, Німеччина	0,1 – 0,15	кукурудза	кукурудзяний стебловий метелик, лучний метелик, бавовникова совка	обприскування в період вегетації	30	2

Гербициди

<i>№ пп</i>	<i>Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна</i>	<i>Норма витрати препарату, (г,кг,л/га,м²,т)</i>	<i>Культура, об'єкт, що обробляється</i>	<i>Об'єкт, проти якого обробляється</i>	<i>Спосіб, час обробок, обмеження</i>	<i>Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)</i>	<i>Максимальна кратність обробок</i>
1.	Гроділ Максі 375 OD, МД (амідосульфурон, 100 г/л + йодосульфурон-метил натрію, 25 г/л + мефенпір-диетил, 250 г/л) Байер АГ, Німеччина	0,09 – 0,11	пшениця, ячмінь ярий	однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	обприскування від фази 2 – 3 листків у культури до появи прапорцевого листка включно	-	1
2.	Баксіга, МД (флорпіраоксибен- зил, 12,5 г/л + пенноксулам, 20,0 г/л) Доу АгроСайенс ВмбХ, Австрія	2,0	рис	широколистяні, злакові та болотні бур'яни	обприскування в період вегетації	-	1

Препарати для роздрібного продажу населенню

Фунгіциди

<i>№ пп</i>	<i>Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна</i>	<i>Норма витрати препарату, (г,кг,л/га,м²,т)</i>	<i>Культура, об'єкт, що обробляється</i>	<i>Об'єкт, проти якого обробляється</i>	<i>Спосіб, час обробок, обмеження</i>	<i>Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)</i>	<i>Максимальна кратність обробок</i>
1.	Нордокс 75, ВГ (NORDOX 75 WG) (оксид міді, 860,0 г/кг) (еквівалент 750,0 г/кг Cu) NORDOX AS., Nordox A.S., Норвегія	10 – 15 г на 10 л води з витратою робочої рідини: молоді дерева – 2 л/дерево, дерева середнього віку – 2 – 5 л/дерево, дерево з великою короною (старого віку) – 5 л/дерево	яблуня	чорний рак, парша, бура плямистість або філостиктоз	обприскування рослин в період вегетації	30	4
		5 – 15 г на 5 л води з витратою робочої рідини на 100 м ² насаджень	томати	фітофтороз, антракноз, альтернаріоз або бура плямистість, чорна бактеріальна плямистість	обприскування рослин в період вегетації	20	4

Добрива

№ пп	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (кг/га, л/га, кг/т, л/т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	Avangard CrystAVit, кр.п. (N – 0 – 46,0%, P ₂ O ₅ – 0 – 53,0%, K ₂ O – 0 – 51,0%, CaO – 0 – 29,0%, MgO – 0 – 33,0%, B – 0 – 11,0%, Fe – 0 – 7,0%, Mn – 0 – 6,0%, Cu – 0 – 5,0%, Zn – 0 – 5,0%, Co – 0 – 1,0%, Mo – 0 – 3,0%) ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна; ТОВ «УКРАВИТ АГРО», Україна	2 – 10	зернові, овочеві, технічні культури, квіти та садові культури	позакореневе підживлення у період вегетації	протягом вегетації з інтервалом 14 днів
2.	Avangard CrystalMax, кр.п. (N – 0 – 2,5%, P ₂ O ₅ – 0 – 3,5%, K ₂ O – 0 – 5,6%, CaO – 0 – 39,0%, B – 0 – 21,0%, Co – 0 – 5,0%, Cu – 0 – 26,0%, Zn – 0 – 38,0%, Fe – 0 – 21,0%, Mn – 0 – 32,0%, Mo – 0 – 5,0%, MgO – 0 – 33,0%) ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна; ТОВ «УКРАВИТ АГРО», Україна	2 – 10	зернові, овочеві, технічні культури, квіти та садові культури	позакореневе підживлення у період вегетації	протягом вегетації з інтервалом 14 днів
3.	Добриво органічне «Компост-СМ», тверде (N – 1,7%, P ₂ O ₅ – 2,5%, K ₂ O – 1,0%, органічні речовини, не менше – 50%) за (ТУ 20.1- 31876859-001:2016) «Добрива органічні. Компости» ТОВ «ГЛОБИНО АГРО», Україна	8 – 15 т/га	кукурудза	основне внесення	1
4.	ІгнайтС² (IgniteS²), р. ((N) – 13000 – 18000 мг/кг, (K ₂ O) – 13000 – 18000 мг/кг), мікроелементи, мг/кг: (B) – 1500 – 1900, (Co) – 200 – 250, (Mn) – 4000 – 5000, (Mo) – 375 – 450, (Zn) – 3600 – 4200) Agri Gro Marketing, Inc., США	4,0 – 5,0	зернові колосові та зернові, зернобобові, олійні культури, буряки цукрові, картопля	передпосівна обробка насіння і бульб	1
		1,25 – 2,0	зернові колосові та зернові, зернобобові, олійні культури, буряки цукрові, картопля	позакореневе підживлення у період вегетації	3
		1,25 – 2,0	зернові колосові культури	обробка ґрунту перед посівом	1

Добрива для роздрібного продажу населенню

№ пп	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (кг/га, л/га, кг/т, л/т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	Avangard CrystAVit, кр.п. (N – 0 – 46,0%, P ₂ O ₅ – 0 – 53,0%, K ₂ O – 0 – 51,0%, CaO – 0 – 29,0%, MgO – 0 – 33,0%, B – 0 – 11,0%, Fe – 0 – 7,0%, Mn – 0 – 6,0%, Cu – 0 – 5,0%, Zn – 0 – 5,0%, Co – 0 – 1,0%, Mo – 0 – 3,0%) ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	2 – 10	зернові, овочеві, технічні культури, квіти та садові культури	позакореневе підживлення у період вегетації	протягом вегетації з інтервалом 14 днів
2.	Avangard CrystalMax, кр.п. (N – 0 – 2,5%, P ₂ O ₅ – 0 – 3,5%, K ₂ O – 0 – 5,6%, CaO – 0 – 39,0%, B – 0 – 21,0%, Co – 0 – 5,0%, Cu – 0 – 26,0%, Zn – 0 – 38,0%, Fe – 0 – 21,0%, Mn – 0 – 32,0%, Mo – 0 – 5,0%, MgO – 0 – 33,0%) ТОВ «Фабрика агрохімікатів», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	2 – 10	зернові, овочеві, технічні культури, квіти та садові культури	позакореневе підживлення у період вегетації	протягом вегетації з інтервалом 14 днів

Регулятори росту рослин

№ пп	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (кг/га, л/га, кг/т, л/т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	*Харвест Смарт, ПГ (1-метилциклопропен, 33 г/л) ТОВ «Еппл Технолоджі», Україна	0,35 г/т плодів (0,07 г/м ³)	яблука та інші плодові культури	післязбиральна фумігація плодів у герметичних камерах плодосховища	1
2.	Архітект, СЕ (мепікват-хлорид, 150,0 г/л + прогексадіон кальцію, 25,0 г/л + піраклостробін, 100,0 г/л) БАСФ СЕ, Німеччина	1,0 л/га препарату + 0,5 кг/га Турбо (сульфату амонію)	соя	обприскування в період вегетації. З додаванням сульфату амонію у співвідношенні 2:1	2

3.	Церон 480 SL, РК (етефон, 480 г/л) Байєр АГ Німеччина	0,75 – 1,0	соє	обприскування в період вегетації для зменшення висоти рослин та стимулювання бічних пагонів	1 – 2
----	---	------------	-----	--	-------

Всього: інсектициди, акарициди, фунгіциди, препарати для протруювання насіння – 25 препаратів;
гербіциди – 15 препаратів;
добрива, регулятори росту рослин – 7 препаратів.

**Заступник директора Департаменту
раціонального природокористування –
начальник відділу
охорони водних ресурсів**



Олександр БОНЬ